

Exercice 1 : Indiquer de quels types sont les variables statistiques suivantes :

(1) l'état civil d'un habitant ; (2) la *taille* d'un étudiant ; (3) le *nombre de pages* d'un support de cours ; (4) la *pluviométrie* dans une région donnée ; (5) le *poids* d'un nouveau-né ; (6) le *degré de qualification* du personnel d'une entreprise ; (7) la *nationalité* d'un résident ; (8) le *groupe sanguin* d'un candidat au Bac ; (9) le *nombre d'enfants* à charge d'un employé ; (10) la *commune* de résidence. On **justifiera** les réponses, en **donnant dans chaque cas**, quelques *modalités/ classes* possibles.

Exercice 2 : Une enquête menée dans une région montagneuse sur la répartition des groupes sanguins a donné les résultats suivants :

Groupe Sanguin	A	B	AB	O
Effectif	40	43	12	5

1. Décrire la population et l'échantillon étudiés.
2. Quel caractère **X** est étudié ? de quelle nature est-il ?
3. Le représenter par le graphique adéquat.

Exercice 3 : Le gérant d'une librairie a relevé pour un livre particulier (qui connaît une très forte popularité) le nombre d'exemplaires vendus par jour. Son relevé a porté sur les ventes des mois de Juillet et Août, ce qui correspond à cinquante-deux (52) jours de vente. Le relevé des observations a donné :

7, 13, 8, 10, 9, 12, 10, 8, 9, 10, 13, 14, 7, 11, 9, 11, 12, 11, 12, 13, 14, 11, 8, 10, 12, 10, 8, 14, 7, 13, 12, 13, 11, 9, 11, 12, 13, 12, 11, 14, 8, 14, 9, 9, 14, 13, 11, 10, 12, 9, 13, 11.

1. Définir la variable statistique étudiée ? quelle est sa nature ? décrire ses modalités.
2. Déterminer le tableau statistique et le compléter par les calculs ultérieurs (nécessaires à la détermination des différents paramètres).
3. Tracer le diagramme associé à la variable **X**. Déduire les polygones des effectifs et des fréquences.
4. Déterminer le mode, la médiane, la moyenne, la variance et l'écart type.
5. Calculer les quartiles ; les interpréter.

Exercice 4 : On a recensé dans quatre-vingt-deux (82) hôpitaux d'un pays, les cas d'une maladie rare et inconnue. On a recueilli les résultats dans le tableau suivant :

X_i	0	1	2	3	4	5
n_i	4	10	28	22	12	6

1. Définir le caractère **X** étudié, de quelle nature est-il ?
2. Que représentent *exactement* X_i et n_i ?
3. Calculer le mode et la médiane du caractère ; retrouver la médiane graphiquement.
4. Calculer les premier et troisième quartiles du caractère. Interpréter.
5. Calculer la variance et l'écart type de **X** (présenter les calculs dans un tableau).

Exercice 5 : La distribution suivante représente la taille (en centimètres) de quarante (40) étudiants :

165	175	180	152	161	152	155	158
154	173	178	179	160	178	180	167
152	172	177	180	175	154	157	159
169	169	170	167	153	169	171	172
172	158	162	157	158	163	168	164

1. Définir la variable statistique étudiée. De quelle nature est-elle ?
2. En utilisant la règle de STURGES, ranger ces observations dans un tableau statistique.
3. Tracer le diagramme associé à cette distribution.
4. Calculer le mode et la médiane du caractère ; retrouver la médiane graphiquement.
5. Calculer les premier et troisième quartiles du caractère. Interpréter.
6. Calculer la variance et l'écart type de X (présenter tous les calculs dans un tableau).

Exercice 6 : Les observations relatives à la variable « poids » obtenues sur un échantillon de soixante (60) étudiants sont transcrites dans le tableau suivant :

Classes	[50,60[[60,70[[70,80[[80,90[[90,100]
Effectifs	7	25	21	2	5

1. Définir *rigoureusement* le caractère étudié et donner sa nature.
2. Dresser le tableau des fréquences relatives et des fréquences cumulées.
3. Calculer : le mode, la médiane, les quartiles, l'intervalle interquartile, la moyenne arithmétique, la variance ainsi que l'écart type.

Exercice 7 (C) : Un supermarché reçoit cent (100) caissettes comprenant chacune neuf (9) pêches. La distribution du nombre de pêches abîmées par caissette est donnée dans le tableau suivant :

N ^{bre} de pêches abîmées	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
N ^{bre} de caissettes	12	29	31	17	5	1	2	2	0	1

1. Définir la variable X étudiée, de quelle nature est-elle ?
2. Dresser le tableau des fréquences relatives et des fréquences cumulées.
3. Quel est le nombre de caissettes ayant un nombre de pêches abîmées au moins égal à 3 ?
4. Quelle est la proportion de caissettes dont le nombre de pêches abîmées est au plus de 4 ?
5. Calculer : le mode, les différents quartiles, l'étendue du nombre de pêches abîmées, la moyenne arithmétique, l'écart absolu moyen et l'écart type.

Exercice 8 (C) : Dans une ferme, on a pesé les œufs qui ont été pondus à une date déterminée (les masses sont exprimées en grammes) :

Masse de l'œuf	[28; 38[[38 ; 48[[48 ; 53[[53 ; 58[[58 ; 63[[63 ; 73[[73 ; 83[
N ^{bre} d'œufs	3	51	74	112	92	62	6

1. Quelle est la variable X étudiée ? Quelle est sa nature ?
2. Donner la représentation graphique de la distribution.
3. Déterminer le mode, la médiane et la moyenne arithmétique.
4. Calculer les 1^{er} et 3^{ème} quartiles, la variance et l'écart type de la variable X .

Exercice 9 (C) : Expliquer comment trouver les quartiles d'une série statistique ordonnée $x_{(1)}, \dots, x_{(n)}$ d'une variable X quantitative discrète. Appliquer aux cas $n = 18$ et $n = 27$.


Corrigé de la série 3 (Statistique Descriptive)


Ex. 1 : Nature des caractères :

- (1) *L'état civil (matrimonial)* d'un habitant : Qualitatif nominal (célibataire, marié, divorcé, veuf).
 - (2) *La taille* d'un étudiant : Quantitatif continu (classes : [130, 140[, ..., [180, 190[, en cm).
 - (3) *Le nombre de pages* d'un support de cours : Quantitatif discret (entiers entre 15/20 et 50/60) s'il s'agit de notes de cours, ce serait proche de la vingtaine, si c'est un cours détaillé-par exemple avec des graphiques/schémas, ce serait la cinquantaine ou même plus !
 - (4) *La pluviométrie* dans une région donnée : quantitatif continu (elle peut varier de qlq mm à plus de 100 mm).
 - (5) *Le poids* d'un nouveau-né : quantitatif continu (varie de 2.8 kg à 5 kg).
 - (6) *Le degré de qualification* du personnel d'une entreprise : qualitatif ordinal (on peut avoir à classer les modalités selon le degré de compétence).
 - (7) *La nationalité* d'un résident : qualitatif nominal.
 - (8) *Le groupe sanguin* d'un candidat au Bac : qualitatif nominal (A, B, AB, O).
 - (9) *Le nombre d'enfants* à charge d'un employé : quantitatif discret (varie de 0 à 8).
 - (10) *La commune* de résidence : qualitatif nominal (il n'y a pas d'ordre sur les modalités).
-

Ex. 2 :

1. La population : les habitants d'une région montagneuse, l'échantillon : un groupe de 100 personnes.
2. Le caractère **X** étudié : Le groupe sanguin d'une personne, il est qualitatif nominal.
3. Le graphique adéquat est soit un diagramme *en barres*, constitué de 4 rectangles dont la surface de chacun est proportionnelle à son effectif, soit un diagramme *circulaire*, il a pour angles des secteurs, respectivement : 144°, 155°, 43° et 18°. Elle s'obtient par une simple règle de trois.





Ex. 3 :


7, 13, 8, 10, 9, 12, 10, 8, 9, 10, 13, 14, 7, 11, 9, 11, 12, 11, 12, 13, 14, 11, 8, 10, 12, 10, 8, 14, 7, 13, 12, 13, 11, 9, 11, 12, 13, 12, 11, 14, 8, 14, 9, 9, 14, 13, 11, 10, 12, 9, 13, 11.

1. La variable statistique étudiée : Nombre d'exemplaires vendus en **un** jour ; il est quantitatif discret ; ses modalités sont les entiers entre 7 et 14 (8 modalités).

2. Le tableau statistique (complet) : X_i désigne le nombre de livres et n_i le nombre de jours durant lesquels il s'est vendu X_i livres.

N ^{bre} de livres X_i	7	8	9	10	11	12	13	14	Total
N ^{bre} de jours n_i	3	5	7	6	9	8	8	6	52
Fréquences f_i	0.058	0.096	0.135	0.115	0.173	0.154	0.154	0.115	1
Fréquences cumulées F_i	0.058	0.154	0.289	0.404	0.577	0.731	0.885	1	/
Effectifs cumulés n_i^c	3	8	15	21	30	38	46	52	/
$n_i X_i$	21	40	63	60	99	96	104	84	567
$n_i X_i^2$	147	320	567	600	1089	1152	1352	1176	6403

3. Tracer le diagramme associé à la variable X : c'est un diagramme en bâtons ; duquel on tire le polygone des effectifs et celui des fréquences.



4. Détermination des différents paramètres :

- le mode est : $M_0 = 11 \text{ l/j}$, c'est la valeur la plus fréquente (graphiquement c'est la valeur qui correspond au bâtonnet le plus élevé) ;
- la médiane vaut : $Med = 11 \text{ l/j}$, C'est la valeur qui correspond à la première fréquence cumulée supérieure ou égale à 0.5.
- la **moyenne arithmétique** $\bar{X} = \frac{1}{52} \sum_{i=1}^8 n_i x_i = \frac{567}{52} = 10.9 \text{ livres/jour}$ (cela signifie que sur une période de 10 jours, il s'est vendu 109 livres en moyenne).
- La **variance** $Var(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^8 n_i X_i^2 - \bar{X}^2 = \frac{6403}{52} - (10,9)^2 = 123.135 - 118.81 = 4.325 (l/j)^2$ et l'**écart type** est donné par $\sigma_X = \sqrt{Var(X)} = 2.08 \text{ l/j}$.

4. Calcul des quartiles : On a $N = 52 = 4p$, avec $p = 13$, donc $Q_1 = \frac{x_{(13)} + x_{(14)}}{2} = 9 \text{ l/j}$, $Q_3 = \frac{x_{(39)} + x_{(40)}}{2} = 13 \text{ l/j}$ (on prend les valeurs dans la cases des effectifs cumulés). Ceci signifie qu'il y a 25% de jours (les 13 premiers jours) où il s'est vendu au plus 9 livres, et aussi 13 jours (les derniers) où il s'est vendu au moins 13 livres (13 ou 14 livres).


Remarque : On peut aussi utiliser les fréquences cumulées pour déterminer les quartiles : Q_1 est la valeur qui correspond à la première fréquence cumulée supérieure ou égale à 0.25 et Q_3 est la valeur qui correspond à la première fréquence cumulée supérieure ou égale à 0.75.

Ex. 4 : On a les résultats du tableau suivant :

X_i	0	1	2	3	4	5	Total
n_i	4	10	28	22	12	6	82
Fréquences f_i	0.050	0.122	0.341	0.268	0.146	0.073	1
Fréquences cumulées F_i	0.050	0.172	0.513	0.781	0.927	1	/
Effectifs cumulés n_i^c	4	14	42	64	76	82	/
$n_i X_i$	0	10	56	66	48	30	210 (2.56)
$n_i X_i^2$	0	10	112	198	192	150	662 (8.073)

1. Le caractère X : le nombre de cas d'une maladie rare dans **un** hôpital ; il est *quantitatif discret*.
2. X_i représente le nombre de cas et n_i désigne le nombre d'hôpitaux correspondants (ie dans lesquels on a dénombré X_i cas).

3. Le **mode** est la modalité de plus grand effectif, $M_0 = 2 \text{ c/h}$; la **médiane** est donnée par $Med = \frac{x_{(41)} + x_{(42)}}{2} = 2 \text{ c/h}$; **graphiquement**, c'est l'abscisse du point d'ordonnée $n/2$ sur le diagramme (en escalier) des effectifs cumulés.




4. Calcul des premier et troisième **quartiles** : L'effectif total $N = 82 = 4p + 2$ avec $p = 20$ donc, $Q_1 = x_{p+1} = x_{(21)} = 2 \text{ cas}$; $Q_3 = x_{3p+2} = x_{(62)} = 3 \text{ cas}$. Interprétation : on trouve 25% d'hôpitaux (soit 20) dans lesquels il y a **au plus** 2 cas de cette maladie, et 25 % (20) dans lesquels il y a **au moins** 3 cas.
5. Calcul de la **variance** et de l'**écart type** : la **moyenne** est donnée par $\bar{X} = 210/82 = 2.56 \text{ cas}$ (ceci signifie que dans 100 hôpitaux, on dénombre, en moyenne 256 cas). La **variance** est donnée par : $Var(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^6 n_i x_i^2 - \bar{X}^2 = 8.0732 - (2.56)^2 = 1.52 \text{ (c/h)}^2$, d'où : $\sigma_X = 1.23 \text{ c/h}$.

Ex. 5 :

1. La variable statistique : X est la taille d'un étudiant (en cm) ; elle est **quantitative continue**.
2. D'après la règle de STURGES, le nombre de classes vaut $k \cong 1 + 3.3 \log_{10}(n) \cong 6$; et l'amplitude de chaque classe est $a = \frac{X_{max} - X_{min}}{k} \cong 5$; d'où le tableau statistique suivant (complété par les calculs ultérieurs) :

Taille (classes)	[152;157[[157;162[[162;167[[167;172[[172;177[[177;182]	Total
N ^{bre} d'étudiants	7	8	4	8	6	7	40
Fréquences f_i	0.175	0.2	0.1	0.2	0.15	0.175	1
Effectifs cumulés n_i^c	7	15	19	27	33	40	
Centres des classes C_i	154.5	159.5	164.5	169.5	174.5	179.5	
$n_i C_i$	1081.5	1276	658	1356	1047	1256.5	6675
$n_i C_i^2$	167091.75	203522	108241	229842	182701.5	225541.75	1116940
C'_i	-15	-10	-5	0	5	10	
$n_i \cdot C'_i$	-105	-80	-20	0	30	70	-105
$n_i \cdot (C'_i)^2$	1575	800	100	0	150	700	3325

3. Le diagramme associé est un *histogramme*, duquel on déduit le polygone des effectifs.



4. Les **modes** : La distribution admet deux classes modales (celles qui correspondent à l'effectif le plus élevé qui est 8), elle est dite bimodale.

La première classe modale est [157; 162[, la valeur de premier mode est


$$M_0 = l_{inf} + \left(\frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \right) a = 157 + \left(\frac{1}{1+4} \right) 5 = \mathbf{158 \text{ cm}}, \text{ avec } l_{inf} \text{ est la limite inférieure de la classe modale,}$$

Δ_1 (resp Δ_2) est la différence entre n_{max} et l'effectif de la classe précédente (resp suivante) et a est l'amplitude de la classe.

La deuxième classe modale est [167; 172[, la valeur de second mode est

$$M'_0 = 167 + 5 \times \frac{4}{6} = \mathbf{170.33}.$$

La classe médiane est $[167; 172[$, elle correspond au premier effectif cumulé $\geq \frac{n}{2}$, on fera remarquer; la médiane : $Med = l_{inf} + \frac{a}{n_0} \left(\frac{n}{2} - n_{inf}^c \right) = 167 + \frac{5}{8} (20 - 19) = \boxed{167.625} \text{ cm} (\cong 1.68m)$; (où n_0 est l'effectif de la classe médiane, n_{inf}^c est l'effectif cumulé de la classe qui précède la classe modale.)
Graphiquement, c'est l'abscisse du point d'ordonnée $n/2$ sur le polygone des effectifs cumulés.



5. Calcul des **quartiles** :

La classe qui contient le premier quartile est $[157; 162[$ (elle correspond au premier effectif cumulé $\geq \frac{n}{4}$:

$$Q_1 = l_{inf}^{(1)} + \frac{a}{n_0^{(1)}} \left(\frac{n}{4} - n_{inf}^{c(1)} \right) = 157 + \frac{5}{8} (10 - 7) = \boxed{158.875} (\cong 159) \text{ cm}.$$

La classe qui contient le troisième quartile est $[172; 177[$ (elle correspond au premier effectif cumulé $\geq \frac{3n}{4}$

$$Q_3 = l_{inf}^{(3)} + \frac{a}{n_0^{(3)}} \left(\frac{3n}{4} - n_{inf}^{c(3)} \right) = 172 + \frac{5}{6} (30 - 27) = \boxed{174.5 \text{ cm}}.$$

Interprétation : il y a 25% d'étudiants (ie 10) qui ont une taille inférieure à **1m59**, et autant (soit 10) qui dépassent **1m745**.

6. Calcul de la **variance** et de l'écart type de X : la **moyenne** vaut $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^6 n_i c_i = \frac{6675}{40} =$

$166.875 \cong 167 \text{ cm}$, et alors $Var(X) = \frac{\sum n_i \cdot c_i^2}{n} - \bar{X}^2 = \frac{1116940}{40} - (166.875)^2 = 27923.5 - 27847.27 = 76.23 \text{ cm}^2$. Cela donne un écart type de : $\sigma_X = \sqrt{76.23} = \boxed{8.73 \text{ cm}}$.

Remarque : Soit $C'_i = C_i - M'_0$ ($M'_0 = 169.5$). Les C'_i sont donnés dans le tableau ; soit $X' = X - M'_0$; on voit que la moyenne de X est $\bar{X} = \bar{X}' + M'_0$ soit : $\bar{X} = (-105/40) + 169.5 = 166.875$; ainsi, la


variance est donnée par : $Var(X') = \frac{\sum n_i \cdot C_i'^2}{n} - \bar{X}'^2 = \frac{3325}{40} - (-2.625)^2 = 83.125 - 6.89 =$

76.235 : Var(X). Cette méthode de calcul s'appelle méthode du *changement d'origine* ; elle est très utile quand on manipule de grands nombres : on les ramène tous autour de 0 en leur retranchant la même valeur, (ce qui a donné d'ailleurs une moyenne « décalée » ici négative).

Ex. 6 :

Classes \mathcal{C}_i	[50,60[[60,70[[70,80[[80,90[[90,100]	Total
Effectifs (n_i)	7	25	21	2	5	60
Effectifs cumulés (n_i^c)	7	32	53	55	60	/
Fréquences f_i	0.117	0.417	0.35	0.033	0.083	1
Fréq. cumulées (f_i^c)	0.117	0.534	0.884	0.917	1	/
Centres des classes C_i	55	65	75	85	95	/
$n_i \cdot C_i$	385	1625	1575	170	475	4230 (70.5)
$n_i \cdot C_i^2$	21175	105625	118125	14450	45125	304500 (5075)

1. La *variable statistique X* étudiée : **le poids d'un** étudiant (en kg) ; elle est de nature *quantitative continue*.
2. Tracé de l'histogramme + polygones (des effectifs et des fréquences).



3. Le **mode** : La classe modale est [60; 70[, le mode est égale à :

$$M_0 = l_{inf} + \left(\frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2}\right)a = 60 + \left(\frac{18}{18+4}\right)10 = \boxed{68.18} \text{ kg};$$

La **médiane** se calcule par : $Med = l_{inf} + \frac{a}{n_0} \left(\frac{n}{2} - n_{inf}^c\right) = 60 + \frac{10}{25} (30 - 7) = \boxed{69.2 \text{ kg}}$. (classe médiane est [60; 70]).

La **moyenne** arithmétique vaut : $\bar{X} = \frac{\sum n_i \cdot C_i}{n} = \frac{4230}{60} = \boxed{70.5} \text{ kg}$.

De même, la **variance** : $Var(X) = \frac{\sum n_i \cdot C_i^2}{n} - \bar{X}^2 = \frac{304500}{60} - (70.5)^2 = \boxed{104.75} \text{ kg}^2$; l'écart type s'en déduit : $\sigma_X = \sqrt{Var(X)} = \boxed{10.235 \text{ kg}}$.

4. Le calcul des **quartiles** se fait de la « même » manière que la médiane :

$Q_1 = l_{inf}^{(1)} + \frac{a}{n_0^{(1)}} \left(\frac{n}{4} - n_{inf}^{c(1)}\right) = 60 + \frac{10}{25} (15 - 7) = \boxed{63.2} \text{ kg}$; (la classe correspondante est [60; 70[elle correspond à la première fréquence cumulée ≥ 0.25)

$Q_3 = l_{inf}^{(3)} + \frac{a}{n_0^{(3)}} \left(\frac{3n}{4} - n_{inf}^{c(3)}\right) = 70 + \frac{10}{21} (45 - 32) = \boxed{76.2} \text{ kg}$, (la classe correspondante est [70; 80[elle correspond à la première fréquence cumulée ≥ 0.75).

L'interprétation est : il y a 25% d'étudiants (soit 15) qui ont un poids inférieur à 63.2 kg, il y en a autant (15 étudiants) dont le poids dépasse 76.2 kg et il reste 50% (soit 30 individus) dont le poids est compris entre ces deux valeurs (des 1^{er} et 3^{ème} quartiles), ie dans l'intervalle (63.2-76.2).

Exercice 7 :

- a) X = Nombre de pêches abîmées dans **une** caisse. X est *quantitative discrète*.
 b) X présente dix (10) modalités : 0, 1, ..., 9. On complète le tableau statistique par les calculs dont on aura besoin par la suite pour l'évaluation des différents paramètres. On obtient :

Pêch abm (X_j)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Nbe csst (n_j)	12	29	31	17	5	1	2	2	0	1	(n)100
Eff Cumulés	12	41	72	89	94	95	97	99	99	100	/
Eff Cum ↓	100	88	59	28	11	6	5	3	1	1	/
Fréquences	0.12	0.29	0.31	0.17	0.05	0.01	0.02	0.02	0	0.01	1
Fréq. Cumulées	0.12	0.41	0.72	0.89	0.94	0.95	0.97	0.99	0.99	1	/
$n_j \cdot X_j$	0	29	62	51	20	5	12	14	0	9	202
$n_j \cdot X_j^2$	0	29	124	153	80	25	72	98	0	81	662
$X_j - \bar{X}$	-2.02	-1.02	-0.02	0.98	1.98	2.98	3.98	4.98	5.98	6.98	/
$n_j \times X_j - \bar{X} $	24.24	29.58	0.62	16.66	9.9	2.98	7.96	9.96	0	6.98	108.88

- c) La proportion de caissettes ayant un nombre de pêches abîmées au moins égal à 3 est donnée par $100 \times \left(\frac{n-72}{n}\right)\% = 28\%$; et la proportion de caissettes dont le nombre de pêches abîmées est au plus de 4 vaut 94%.
- d) Le **mode** est donné par $M_0 = 2pa/c$ (correspond à l'effectif le plus élevé), et la **médiane** vaut : $Med = \frac{x_{(50)} + x_{(51)}}{2} = 2 \text{ pa}/c$. (car $n = 100 = 2p = 2 \times 50$.)
- e) La **moyenne** se calcule par : $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{10} n_i X_i = \frac{202}{100} = 2.02 \text{ pa}/c$: ceci signifie que, en moyenne, on dénombre deux-cent deux (202) pêches abîmées dans 100 caissettes (cad sur 900, ce qui constitue 22.44%, qui est un pourcentage non négligeable).

La variance est donnée par : $Var(X) = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{10} n_i X_i^2\right) - \bar{X}^2 = 6.62 - (2.02)^2 = 2.5396 \text{ (pa/c)}^2$;
 et l'écart type vaut $\sigma_X = 1.6 \text{ pa/c}$.

On a aussi : $Q_1 = \frac{x_{(25)} + x_{(26)}}{2} = 1 \text{ pa/c}$; de même : $Q_3 = \frac{x_{(75)} + x_{(76)}}{2} = 3 \text{ pa/c}$ (car $n = 100 = 4p = 4 \times 25$); il y a 25 caissettes (25%) avec *au plus* 1 **pa** et 25 caissettes (25%) avec *au moins* 3 **pa**.

L'étendue : est la valeur maximale- la valeur minimale=9-0=9.


L'écart absolu moyen est donné par : $Eam = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{10} n_i |X_i - \bar{X}| = 1.09 \text{ pa/c}$.

Exercice 8 (C) :

Classes(masse en g)	[28; 38[[38; 48[[48; 53[[53; 58[[58; 63[[63; 73[[73; 83[Total
Effectifs n_i	3	51	74	112	92	62	6	400
Amplitudes a_i	10	10	5	5	5	10	10	/
Eff. corrigés n'_i	1.5	25.5	74	112	92	31	3	/
Eff. Cum. n_i^c	3	54	128	240	332	394	400	/
Fréquences f_i	0.0075	0.1275	0.185	0.28	0.23	0.155	0.015	1
Fréq. Cum f_i^c	0.0075	0.1350	0.320	0.60	0.83	0.985	1	/
C_i	33	43	50.5	55.5	61.5	68	78	/
$n_i C_i$	99	2193	3737	6216	5658	4216	468	22587
$n_i C_i^2$	3267	94299	188718.5	344988	347967	186688	36504	1302431.5

1. La variable statistique X étudiée : le poids d'un œuf (en g) ; elle est de nature *quantitative continue*.
2. Tracer l'histogramme + polygones des effectifs (ou des fréquences). Ici il faut considérer les différentes amplitudes de classes, il y en a deux (5 et 10), et donc on aura des effectifs corrigés : une amplitude de base à choisir étant 5, certaines classes ont 2 unités d'amplitude ! et donc leur effectif sera divisé par 2. $n'_i = n_i \times \frac{\text{la plus petite amplitude}}{\text{l'amplitude de la classe}}$, on aura par exemple $n'_1 = n_1 \times \frac{5}{10} = 1.5$.

Pour dresser le polygone des effectifs on partage les rectangles de manière à avoir toutes les amplitudes sont égales au **PGCD** des amplitudes, ie **PGCD(5 ;10)=5**, puis on relie les milieux des sommets par des segments de droite.



Remarque : Pour avoir le polygone des fréquences on met les fréquences corrigées sur l'axe des ordonnés.

3. Le **mode** : La classe modale est $[53;58[$ (la classe qui correspond à l'effectif corrigé le plus élevé) , le mode est égal à : $M_0 = l_{inf} + \left(\frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \right) a_{mo} = 53 + \left(\frac{38}{38+20} \right) 5 = \boxed{56.28} g.$

La **médiane** : La classe médiane est $[53;58[$ (la classe qui correspond à la première fréquence cumulée ≥ 0.5) , le médiane est égal à $Med = l_{inf} + \frac{a}{n_0} \left(\frac{n}{2} - n_{inf}^c \right) = 53 + \frac{5}{112} (200 - 128) = \boxed{66.21g}.$

La **moyenne arithmétique** : $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^7 n_i c_i = \frac{22587}{400} = 56.47g.$

4. Le calcul des quartiles se fait de la même manière que la médiane :

$Q_1 = l_{inf}^{(1)} + \frac{a}{n_0^{(1)}} \left(\frac{n}{4} - n_{inf}^{c(1)} \right) = 48 + \frac{5}{74} (100 - 54) = \boxed{51.11} g ;$ (la classe correspondante est $[48; 53[$ elle correspond à la première fréquence cumulée ≥ 0.25)

$Q_3 = l_{inf}^{(3)} + \frac{a}{n_0^{(3)}} \left(\frac{3n}{4} - n_{inf}^{c(3)} \right) = 58 + \frac{5}{92} (300 - 240) = 61.26g,$ (la classe correspondante est $[58; 63[$ elle correspond à la première fréquence cumulée ≥ 0.75).

L'interprétation est : il y a dans l'échantillon, 25% d'œufs (soit 100) qui ont un poids inférieur à 51.11 g, il y en a autant (100) dont le poids dépasse 61.26g et il reste 50% (soit 200 œufs) dont le poids est compris

entre ces deux valeurs (des 1^{er} et 3^{ème} quartiles), ie dans l'intervalle (51.11g ; 61.26g). Cet intervalle est de longueur 10.15g.

La variance : $Var(X) = \frac{\sum n_i \cdot C_i^2}{n} - \bar{X}^2 = \frac{1302431.5}{400} - (56.47)^2 = 67.22g^2$; l'écart type s'en déduit : $\sigma_X = \sqrt{Var(X)} = \boxed{8.2g}$.

Exercice 9 :

Calcul des **quartiles** d'une distribution (les 3 **paramètres** qui **divisent** celle-ci en **4 parties** de même effectif : **25%** chacune) dans le cas discret : (**Rappel** : $Q_2 = Med$).

Soit r le reste de la division de n par 4 ($r = 0, 1, 2$ ou 3)

- 1) $n = 4p$ ($r = 0$) : $Q_1 = \frac{x_{(p)} + x_{(p+1)}}{2}$, $Q_2 = \frac{x_{(2p)} + x_{(2p+1)}}{2}$ et $Q_3 = \frac{x_{(3p)} + x_{(3p+1)}}{2}$;
- 2) $n = 4p + 1$ ($r = 1$) : $Q_1 = \frac{x_{(p)} + x_{(p+1)}}{2}$, $Q_2 = x_{(2p+1)}$, $Q_3 = \frac{x_{(3p+1)} + x_{(3p+2)}}{2}$;
- 3) $n = 4p + 2 [= 2k]$ ($r = 2$) : $Q_1 = x_{(p+1)}$, $Q_2 = \frac{x_{(2p+1)} + x_{(2p+2)}}{2}$ et $Q_3 = x_{(3p+2)}$;
- 4) $n = 4p + 3 [= 2k + 1]$ ($r = 3$) : $Q_1 = x_{(p+1)}$, $Q_2 = x_{(2p+2)}$ et $Q_3 = x_{(3p+3)}$.

Remarque 1 : Dans ce dernier cas, on peut écrire : $Q_i = x_{(i \times (p+1))}$ ($i = 1, 2, 3$).

Remarque 2 (Mnémotechnique) :

Des 3 quartiles Q_1, Q_2 et Q_3 , le nombre de **ceux qui sont**, dans chaque cas, **égaux à des observations** (dont il faut déterminer le rang) est le même que le **reste r de la division de n par 4**.

Ainsi :

- quand $r = 0$, il n'y a **AUCUN** des 3 qui soit une observation ;
- pour $r = 1$, la **médiane** est la **SEULE** qui est une observation (de rang $2p + 1$) ;
- si $r = 2$, Q_1 **ET** Q_3 sont des observations (respectivement de rangs : $p + 1$ et $3p + 2$) ;
- et pour $r = 3$, **TOUS** les 3 sont des observations (de rangs $i(p + 1)$, $i = 1, 2, 3$).

Application :

- a) $n = 18 = 4 \times 4 + 2$: $Q_1 = x_{(5)}$, $Q_2 = \frac{x_{(9)} + x_{(10)}}{2}$ et $Q_3 = x_{(14)}$;
- b) $n = 27 = 6 \times 4 + 3$: $Q_1 = x_{(7)}$, $Q_2 = x_{(14)}$ et $Q_3 = x_{(21)}$.

Deux autres cas :

- c) $n = 1001 = 250 \times 4 + 1$: $Q_1 = \frac{x_{(250)} + x_{(251)}}{2}$, $Q_2 = x_{(501)}$, $Q_3 = \frac{x_{(751)} + x_{(752)}}{2}$.
- d) $n = 2022 = 500 \times 4 + 2$: $Q_1 = x_{(501)}$, $Q_2 = \frac{x_{(1011)} + x_{(1012)}}{2}$, $Q_3 = x_{(1502)}$.